



Drs. Roos Stoop
Halerweg 13-B
9433 TE Zwiggelte
06 – 48 119 773 (app)
0593 20 20 60 (telefoon)
www.DierenartsRoos.nl
info@dierenartsroos.nl

Algemene regels ontworming en wormbeleid

1. Een correct wormbeleid bestaat niet enkel uit het toedienen van een anti-parasitair middel! Het **management van de omgeving** is minstens even belangrijk.
 - 1.1. De weide en stallen zijn het best zo schoon mogelijk, m.a.w. zo weinig mogelijk mest.
 - 1.2. Houd er rekening mee dat jongere dieren nog geen weerstand hebben opgebouwd tegen de wormen en dat zij dus méér eieren uitscheiden.
 - 1.3. Een te hoge bezettingsgraad van een weide/paddock leidt tot hele hoge aantallen eieren en larven op dat stukje land.
2. Ontworm volwassen dieren standaard 1x maal per jaar in november/begin december tegen lintwormen. Daarnaast wordt best enkel ontwormd wanneer uit het mestonderzoek (eind maart/begin april en eind juni/begin juli) blijkt dat dit nodig is.
3. De **hoeveelheid die van de wormenkuur gegeven wordt** is énorm belangrijk. Onderdosereren zorgt ervoor dat niet alle wormen gedood worden en verhoogt kans op resistentie. Een lichte overdosering is niet schadelijk!
4. Moxidectine (Equest® of Equest Pramox®) mag **NOOIT** aan dieren jonger dan 6 maanden gegeven worden.
5. Ontwormen van de **drachtige merrie ± 1 maand voor de geboorte** is nuttig om haar ei-uitscheiding te verminderen en de overdracht van een wormeninfectie via de melk te voorkomen. Zo wordt de infectiedruk voor het veulen enorm verminderd.
6. Hoe jonger het dier, hoe gevoeliger het is voor een wormeninfectie en hoe belangrijker dus een schone (mestvrije) omgeving is.